阿托伐他汀联合 脑梗死患者脑血流参数和颈动脉粥样硬 影响

宋　博[1]，孙玉坤[1]，何　伟[1] 朱红霞[2]，王海鹏[1]，苏　宏[3]

【摘要】 目的　探讨阿托 梗死患者颈动脉粥样硬化斑块和脑血流参数的影响。方法　!$. 例脑梗死患者随机分为两组，对照组 治疗，实验组 ''/ 例在对照组治疗的基础上，加用银杏叶制剂。比较两组治疗前后颈动脉粥样硬化斑块 化，同时记录用药期间不良反应。结果　实验组治疗后血流动力学指标 %U("(.! i "('E) 、6U("(/' i E(!/ i!(&!) DC¢F、8F(&'($$ i$(.&) DC¢F、8C(/(E& i'(!!) DC¢F 高于对照组(+ f "(".)；实验组治疗) DC!、27U*G('(!) i "('E) CC 低于对照组(+ f "(".)；两组不良反应率无统计学差异。结论　阿托伐 够促进脑梗死患者血流动力学参数表达水平的恢复，改善颈动脉粥样硬化斑块，安全性高。

【关键词】 阿托伐他汀；银 流参数；颈动脉粥样硬化斑块

【中国图书分类号】 %$)#(

DOI:10.14010/j.cnki.wjyx.2(

B**,-%$ "* &%"6&$%&%) & 1/,1&/&%)"($ "(-,/,3/&+ 3+""# *+"< 1&/&0,%,/$

&(# -&/"%)# &%7,/"$-+,/')(1&%),(%$ <)%7 -,/,3/&+)(*&/-%)"(

>I<T W9'，>X< aKHK5'，\ <T _3+'，_\X \95@h4-$，^7<T \-4N+5@'，-50 >X \95@#('(P+N-B,J

C+5, 9Z 63-BC-D= -50 MYK4NC+5, * +O4D45+，#(P+N-B,C+5, 9Z T+5+B-: >KB@+B=，?4-9545@ 6B9L45D4-: 29BNF

\9FN4,-: 9Z 2345+F+ 6+9N:+'F 7BC '""$#，2345-; !(\+-:,3D-B+ G+-C 9Z 7BC= /$$!'，>3+5=-5@ ''""$#，

2345-

【23$%/&-%】 435,-%)6, G9 F,-,45 -50 @45H@9 O4:9O- NB+N-B-,495F 95 D+B+OB-: O:990 Z:9A N-B-C+,+BF

-50 D-B9,4O -,3+B9FD:+B9,4D N:-YK+ 4 -: 45Z-BD,495(!,%7"#$ GA9 3K5OB+0 -50 ,34B,=J4L+ N-,4+5,F A4,3 D+BJ

+OB-: 45Z-BD,495 A+B+ F+:+D,+0 45 9K O4L40+0 45,9 ,A9 @B9KNF -DD9BO45@ ,9 ,3+ OBK@ B+@4C+5(G3+ D95,B9:

@B9KN(.e'')) A-F ,B+-,+0 A4,3 - -: @B9KN(.e''/) A-F -OO4,495-::= @4L+5 @45H@9 O4:9O- NB+N-B-,495F(

G3+ D3-5@+F 9Z D-B9,4O -,3+B9FD:+B9 -C4D N-B-C+,+BF -50 3+C9B3+9:9@4D-: 450+h+F A+B+ D9CN-B+0 O+Z9B+

-50 -Z,+B ,B+-,C+5,(Be-50BD+0 D5F(

介：宋　博，本 学历，主
者单位：''""$# 沈 ，武警辽
#(普外科；!('""$ 沈阳，解放军
通讯作者：苏 C-4::'""./

! 对象与方法

!#! 对象 选择武警辽 J'. 至

!"'EJ'. 收治的脑梗死患者 ! 组，

对照组 ''）例和实验组 '' #$ g

E! 岁，平均（.）（'& i !（!#） 列，病

程 # 个月 g . 年，平均（'（E 年龄

#E gE. 岁，平均（ ./（ !） i 则，女

）' 例，病程 . 个月 gE 年， 1.708 -1 Tf 1.708 -1 Tf 1.708 -1DC2 1B/F# i "（

两组年龄、性别、病程无统计学差

!#" 诊断标准 患者狡k 《

断要点》 [骏伴]中0关于急性脑 觉 卲 卲抵 h亦E]行

2G、 ，证实为脑梗死

组)(/"Q ,两组无统计学差

组间颈动脉粥样硬化斑块指标的变化情况 (¯, i -)

组别	例数	斑块面积 (DC¹)	不稳定性斑块(.;Q)			
			钙化结节性病变	破裂斑块	侵蚀性斑块	合计
实验组	''/					
治疗前		"(/) i "('	!.(!'("')	#E(#'(!$)	#!($)(&#)	''#(/.(&")
治疗后		"(.! i "('	E(.(&&) !"	'&('.('$) !"	'.('!(/$) !"	#"($$()') !"
对照组	'')					
治疗前		"(/$ i "('E	!.(!'(..)	##($E(/$)	#'($.($#)	''"(/#(&$)
治疗后		"()& i "('S	'#('!("E) !	!.(!'(..) !	!$('/(&$) !	)!(.$(#.) !

注: 比治疗前比较, ! + f "(".; 与对

表 $ 脑梗死患者两组间

实验组

Q)

组别

[$] 安占军，徐立霞，曹洁珺